

**Classification de ALTEMEIER**  
**(Classe de contamination des interventions chirurgicales)**  
(DARDE Maxime – [www.laryngo.com](http://www.laryngo.com))

**Il permet de répartir les interventions chirurgicales selon le  
risque de  
contamination et d'infection postopératoire**

<b>Type de chirurgie</b>	<b>Critères de sélection</b>
<b>Chirurgie propre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sans ouverture de viscères creux</li><li>• Pas de notion de traumatisme ou d'inflammation probable.</li></ul>
<b>Chirurgie propre contaminée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouverture de viscères creux avec contamination minime</li><li>• Rupture d'asepsie minime</li></ul>
<b>Chirurgie contaminée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contamination importante par le contenu intestinal</li><li>• Rupture d'asepsie franche</li><li>• Plaie traumatique récente datant de moins de 4 heures</li><li>• Appareil génito-urinaire ou biliaire ouvert avec bile ou urine infectée.</li></ul>
<b>Chirurgie sale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plaie traumatique datant de plus de 4 heures et / ou avec tissus dévitalisés</li><li>• Contamination fécale</li><li>• Corps étranger</li><li>• Viscère perforé</li><li>• Inflammation aiguë bactérienne sans pus</li><li>• Présence de pus.</li></ul>