

I – NALOXONE (NARCAN®)

Délai d'action : 2 minutes
Durée d'action : 45 minutes

Réalisation :

1 ampoule (0,4mg) dilués dans 10cc (40µ/ml)
Titration 1µg/kg toute les 3 minutes pour FR>12

Précautions :

Mauvaise antagonisation de la buprénorphine

Si dose trop importante :

Levée de l'analgésie, avec poussées de tachycardie, d'HTA
Hyperactivité par levée de la sédation

II – NEOSTIGMINE (PROSTIGMINE®)

Ampoules de 0,5 mg dans 1 ml
Anticholinestérasique

Réalisation :

5 ampoules de Prostigmine + 5 ampoules d'atropine a 0,25 dans 10cc
Dose : 40µg/kg de Prostigmine et 20µg/kg d'atropine

Pic d'action : 8 minutes (MAPAR 2001)
Durée d'action : 1 heure environ (MAPAR 2001)

Précaution :

2 réponses au minimum au TOF avant de décurariser
4 réponse si PAVULON®

Contre indication avec la succinylcholine

Effets secondaires : effets muscariniques parasympathiques

Bradycardie
Bronchospasme
Myosis
Hypersalivation

III – FLUMAZENIL (ANEXATE®)

Ampoules de 1 mg dans 10 ml ou 0,5 dans 5 ml

Réalisation

0.2mg en 15 secondes, puis 0,1mg toute les minutes
Ne pas dépasser 1mg au total

Contre indications

Epilepsie, traitement chronique (risque de sevrage), intoxic en association avec un produit convulsivant, anesthésie à la kétamine (risque agitation, cuchemards)